

용법용량

(경구 : 정제, 엘릭실제)

1. 성인

- 1) 급속 포화요법(포화량 : 1.0-4.0mg) : 디곡신으로서 초회 0.5-1.0mg, 이후 0.5mg을 6-8시간마다 경구투여하고 충분한 효과가 나타날 때까지 계속한다.
- 2) 완서 포화요법을 사용할 수도 있다.
- 3) 유지요법 : 1일 0.25-0.5mg을 경구투여한다.

2. 소아

1) 급속 포화요법

2세 미만 : 1일 체중 kg당 0.06-0.08mg을 3-4회 분할 투여한다.

2세 이상 : 1일 체중 kg당 0.04-0.06mg을 3-4회 분할 투여한다.

2) 유지요법

포화량의 1/5-1/3을 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(주사제)

1. 성인

- 1) 급속 포화요법(포화량 : 1.0-2.0mg) : 디곡신으로서 1회 0.25-0.5mg을 2-4시간마다 정맥주사하고 충분한 효과가 나타날 때까지 계속한다.
- 2) 완서 포화요법을 사용할 수도 있다.
- 3) 유지요법 : 1일 0.25mg을 정맥주사한다.

2. 소아

1) 급속 포화요법

① 신생아, 미숙아 : 1일 체중 kg당 0.03-0.05mg을 3-4회 분할 정맥 또는 근육주사한다.

② 2세 미만 : 1일 체중 kg당 0.04-0.06mg을 3-4회 분할 정맥 또는 근육주사한다.

③ 2세 이상 : 1일 체중 kg당 0.02-0.04mg을 3-4회 분할 정맥 또는 근육주사한다.

2) 유지요법

포화량의 1/15-1/10을 정맥 또는 근육주사한다

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.