사용상의주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것(앰플제에 한함).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 유전성 과당불내증 환자

2) 저장성 탈수증 환자

3) 메칠알코올 중독 환자

4) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 요붕증 환자

2) 과당뇨증(fructosuria) 환자

3) 고뇨산혈증 환자

4) 후각과민반응

5) 쇽상태

6) 간·신질환 환자

4. 이상반응

1) 대량투여로 발한, 홍조가 나타날 수 있다.

2) 대량급속투여에 의해 전해질 상실을 일으킬 수 있으므로 신중히 투여한다.

5. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 신중히 투여한다.

6. 적용상의 주의

1) 피하대량투여에 의해 혈장으로부터 전해질이 이동해서 순환부전을 초래할 수 있으므로 피하주사하지 않는다.

2) 투여전 : 투여하기 직전에 감염에 대한 주의를 한다(환자의 피부나 기구소독). 한냉기의 경우 체온 정도로 따뜻하게 하여 사용한다. 개봉한 후에는 곧바로 사용하고 잔액은 사용하지 않는다.

3) 투여시 : 천천히 정맥내 투여한다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

포장 내 물방울이 있거나 용액이 착색 또는 혼탁되어 있는 것은 사용하지 않는다.

8. 기타

과당의 대량 급속투여에 의해 젖산산증, 고뇨산혈증, 혈전성정맥염, 흉부나 위부의 불쾌감, 통증이 나타났다는 보고가 있다.