사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 알레르기성 접촉성 습진이 나타나기 쉬운 환자

2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 부작용

1) 과민증 : 발진 등이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 정신신경계 : 고열, 두통이 나타날 수 있다.

3) 소화기계 : 구역이 나타날 수 있다.

4) 구강 : 발진, 두드러기, 미란, 드물게 구강 · 인두의 작열감 등 구강점막의 과민반응이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

3. 소아에 대한 투여(트로키제에 한함)

정제를 삼킬 위험이 있으므로 3세 이하의 영 · 유아에는 투여하지 않는다.

4. 적용상의 주의(트로키제에 한함)

침으로 천천히 녹여 복용하며 유효성분이 장시간 입안에 머물도록 씹거나 삼키지 말고 가능한한 오래 입안에 물고 있는다.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.