용법용량

(경구 : 정제 1mg)

성인 : 황산헥소프레날린으로서 초회량 1일 1.5mg 그 후 증량하여 1일 3mg을 3회 분할 경구투여한다.

소아 : 6-10세 1회 0.25-0.5mg, 3-5세 1회 0.25mg 1일 1-3회 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(경구 : 정제 0.5mg)

o 성인 : 황산헥소프레날린으로서 초회량 1일 1.5mg 그 후 증량하여 1일 3mg을 3회 분할 경구투여한다.

o 소아

1) 6-10세 1회 0.25-0.5mg, 3-5세 1회 0.25mg, 1-2세 1회 0.125-0.25mg, 6개월-1세 미만 1회 0.125 mg 1일 1-3회 투여한다.

2) 3-5개월 : 1회 0.125mg 1일 1-2회 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(주사제)

o 성인 : 황산헥소프레날린으로서 급성 발작시 1회 5μg(2ml), 심한 호흡곤란시 1회7.5-10μg(3-4ml)을 3-5분에 걸쳐 천천히 정맥주사한다.

o 소아 : 3-10세 1회 3-4μg(1.2-1.6ml), 1-2세 1회 2-3μg(0.8-1.2ml), 6개월-1세 미만 2μg(0.8ml), 3-5개월 1회 1μg(0.4ml) 1일 1-3회 주사한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.