사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 지금까지 이 약에 대한 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 사람

2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 부작용

1) 과민증 : 과민증이 나타나는 경우에는 복용을 중지한다.

2) 소화기 : 때때로 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 변비 등의 증상이 나타날 수 있다.

3. 일반적주의

1) 정해진 용법 · 용량을 지킨다.

2) 이 약은 근본적 치료제가 아닌 대증요법제이며 장기연용할 경우 치료를 지연시키고 그 결과 요로감염증 등 합병증을 유발시킬 수 있으므로 특히 주의한다.

3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.