사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자

2) 고막 천공[뚫림]이 있는 환자

3) 눈주위

2. 다음 환자에는 신중히 투여 하십시오.

1) 상처가 심하거나 화상이 심한 환자

2) 찔린 상처, 동물에 물린 상처

3. 부작용

1) 과민증 : 발진 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.

2) 장기 연용[계속 사용] : 신장애[신장장애], 난청[귀먹음]이 나타날 수 있으므로 장기연용[계속 사용]을 피합니다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.

2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용하십시오.

3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의 합니다.

4) 감작[과민상태로 만듦]되어 있을 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 감작[과민상태로 만듦]증상(가려움, 발적[충혈되어 붉어짐], 부종[부기], 구진, 소수포[물집] 등)이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다.

5) 내성균 또는 비감수성균의 과잉증식을 초래할 수 있습니다. 이러한 현상이나 자극감, 과민증, 중복감염이 생길 경우에는 적절한 처치를 합니다.

6) 광범위한 화상, 궤양이 있는 피부에는 장기간 사용하지 않습니다.

5. 적용상의 주의

이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관 하십시오.

3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.