사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 복용시 다음 사항에 주의할 것.

1) 정해진 용법 • 용량을 지킬 것.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것.

3. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.

1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.

2) 드물게 발진, 가려움증 등의 과민증이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.

3) 때때로 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.

4) 이 약에 함유되어 있는 비타민 B_6가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있다.

4. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것.

3) 오용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.