사용상의주의사항

1.경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말것

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1)다른 약물을 투여 받고 있는 환자

3. 부작용

이 약을 투여하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다

4. 일반적 주의

1)정해진 용법,용량을 잘 지킨다.

2)2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고

약사 또는 의사와 상의한다.

5.소아에 대한투여

1)이 약은 7세 이하의 영,유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2)직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3)오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

7. 1일 허용량 제한

아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/1kg/1일)이하로 조정(가능한한 최소량 사용) 할 것

60킬로그램 성인: 1일 최대 복용량 2.4그램