사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 또는 안식향산에스테르(코카인 제외)계 국소마취제에 과민증 환자

2. 부작용

1) 쇽 : 드물게 쇽이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 혈압저하, 안면창백, 맥박 이상, 호흡억제 등이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 인공호흡, 산소흡입, 수액, 탄산수소나트륨 · 혈압상승제 투여, 적절한 체위 등 적절한 처치를 한다.

2) 중추신경계

① 드물게 진전, 경련 등의 중독한 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 인공호흡, 산소흡입 등의 처치와 함께 디아제팜 또는 초단시간형 바르비탈산 제제(치오펜탈나트륨 등) 투여 등 적절한 처치를 한다.

② 졸음, 불안, 흥분, 무시, 어지러움, 구역, 구토 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 쇽 또는 중증의 증상으로의 이행에 주의하고 필요에 따라 적절한 처치를 한다.

3) 과민증 : 두드러기, 부종 등이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

1) 드물게 쇽이 나타날 수 있으므로 국소마취제 사용시에는 즉시 구급처치를 할 수 있도록 준비해두는 것이 바람직하다.

2) 부작용을 완전히 방지할 수 있는 방법은 없으므로 다음에 유의한다.

① 환자의 전신상태를 충분히 관찰한다.

② 가능한 낮은 농도의 것을 사용한다.

③ 가능한 필요최소량을 사용한다.

4. 상호작용

1) 다음 환자에 투여하는 경우에는 혈관수축제(에피네프린, 노르에피네프린)를 첨가하지 않는다.

① 혈관수축제에 과민증 환자

② 고혈압, 동맥경화, 심부전, 갑상선기능항진, 당뇨병, 혈관경련 등이 있는 환자

2) 다음 환자에 혈관수축제(에피네프린, 노르에피네프린)를 첨가하여 투여하는 경우에는 신중히 투여한다.

① 시클로프로판, 할로탄 등의 할로겐 함유 흡입마취제 투여 환자

② 삼환계 항우울약 또는 MAO저해제 투여중인 환자

5. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

6. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 주의한다.

7. 적용상의 주의

안과용으로 사용하지 않는다.

8. 경고(액제)

이 약에 함유되어 있는 인공 감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페니알라니으로 대사 되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 않는다.

9. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (액)

이 약은 황색 4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력 이 있는 회사에는 신중히 투여한다.