사용상의주의사항

1. 이상반응

각막 내피에 이상이 있을 때 관류 또는 기타 외상으로 인해 수포성, 염증성 각막질환을 일으킬 수 있다.

2. 일반적 주의

각막과 다른 안조직의 손상을 최소화시키기 위해 모든 외과 수술에서처럼 용법 · 용량에 맞게 사용해야 한다.

3. 적용상의 주의

1) 이 액은 안과 수술시 관류 용액으로만 사용하고 정맥내 주사용으로는 사용하지 않는다.

2) 이 액은 방부제를 포함하고 있지 않으므로 사용 후 다시 사용할 수 없다. 약액이 혼탁하거나 진공이 되어 있지 않으면 사용하지 않는다.

3) 다른 약품을 첨가하여 사용하면 안내조직에 손상을 일으킬 수 있으므로 주의한다.

4) 사용할 준비가 될 때까지 포장지로부터 유니트를 제거하지 않는다(비에스에스액플라스틱백타입에 한함).

5) 포장지는 방수용이고, 안쪽 백은 용액을 무균상태로 유지시킨다. 포장지를 제거한 후, 안쪽 백을 꽉 눌러 누수되는 곳이 있는 지 몇 분간 검토한다. 만약 누수되는 곳이 발견되면 오염의 가능성이 있으므로 폐기한다(비에스에스액플라스틱백타입에 한함).

4. 저장상의 주의사항

실온에서 보관하며 지나친 열을 피한다.