용법용량

○ 성인 : 세파클러로서 1회 250mg(역가)을 8시간마다 경구 투여한다. 중증감염증(폐렴 등)과 감수성이 낮은 감염증의 경우 2배로 증량 투여할 수 있다. 급성 임균성 요도염의 경우 이 약 3g과 프로베네시드 1g을 단회 병용 투약한다.

○ 소아 : 1일 체중 Kg당 20mg(역가)을 8시간마다 분할 투여한다. 중증감염증, 중이염 및 감수성이 낮은 감염의 경우에는 1일 체중 Kg당 40mg(역가)을 투여할 수 있으며 최대용량은 1일 1g(역가)이다.

○ 신기능 손상 환자 : 용량 변화 없이 투여할 수 있다.

베타용혈성 연쇄구균감염의 치료는 적어도 10일간 투여해야 한다.

건조시럽제인 경우 다음과 같은 현탁액으로 하여 투여한다.

1일 체중 Kg당 20mg(역가)의 경우

체중(Kg)	125mg/5mL	250mg/5mL
9 18	1회2.5mL(1/2티스푼씩) 1일 3회 1회 5mL(1티스푼씩) 1일 3회	- 1회2.5mL(1/2티스푼씩) 1일 3회

1일 체중 Kg당 40mg(역가)의 경우

체중(Kg)	125mg/5mL	250mg/5mL
9 18	1회 5mL(1티스푼씩) 1일 3회 -	1회2.5mL(1/2티스푼씩) 1일 3회 1회 5mL(1티스푼씩) 1일 3회

- 1일 2회 치료법 : 중이염 및 인두염의 경우 1일 투여량을 12시간마다 분할 투여할 수 있다.

1일 체중 Kg당 20mg(역가)의 경우(인두염)

체중(Kg)	187mg/5mL	375mg/5mL
9 18	1회2.5mL(1/2티스푼씩) 1일 2회 1회 5mL(1티스푼씩) 1일 2회	- 1회2.5mL(1/2티스푼씩) 1일 2회

1일 체중 Kg당 40mg(역가)의 경우(중이염)

체중(Kg)	187mg/5mL	375mg/5mL
9 18	1회 5mL(1티스푼씩) 1일 2회 -	1회2.5mL(1/2티스푼씩) 1일 2회 1회 5mL(1티스푼씩) 1일 2회

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.