# 사용상의주의사항

1. 다음과 같은 경우에는 이 약을 사용하지 말 것.

1) 이 약은 국소적으로 사용하여야 하며 비경구적 주사제로 사용하지 않는다.

2) 이 약은 저장액으로 용혈을 일으킬 수 있으므로 외과적 수술시의 사용은 바람직하지 않다.

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 카테터나 배액관을 잘못된 곳에 위치시키면 목적하지 않은 조직이나 체강의 관류 또는 침윤을 일으킬 수 있다.

2) 밀폐된 체강의 관류중에 과도한 용량이나 압력을 가하면 조직이 확장되거나 파괴될 수 있다.

3. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

1) 전신흡수되면 체액의 과부하를 일으킬 수 있고 결과적으로 혈청 전해질이 희석되거나 체액과잉, 울혈성 상태, 폐부종을 일으킬 수 있다.

2) 중증 심부전, 신부전 환자에게 비뇨기과 관류용으로 사용하면 전신적 흡수가 일어나 심장, 신장 기능의 변화를 일으킬 수 있으므로 주의깊게 사용한다.

3) 관류용액 사용 중에 이상반응, 체액과잉 등이 나타나면 사용을 중지한 후 환자를 면밀히 관찰하고 필요하면 적절한 처치를 한다.

4) 부유물질이 있거나 용기가 훼손되었을 때는 사용하지 않는다.

5) 관류로 사용시는 새로 개봉한 것을 사용하고 잔액은 재사용하지 않는다.

4. 저장상의 주의사항

1) 40℃ 이하에서 보관한다.

2) 얼리거나 66℃ 이상으로 가열하지 않는다.