용법용량

(겔제)

반드시 지시한 대로만 사용하며 권장용량을 초과하지 않는다.

1. 머리이

이 약 15g 정도를 머리카락에 바르고 3일간 방치 후 머리를 감는다. 보통 1회 적용으로 치유된다. 치료 후에도 가려움이 있을 수 있으나 이것은 치료되지 않은 것이 아니며 살아있는 머리이가 보이지 않는다면 재치료할 필요가 없다.

2. 사면발이

조심스럽게 감염된 신체부위에 적당량을 잘 문질러 펴바르고 3일간 방치후 씻어낸다.

3. 옴

1) 성인 및 10세 이상 소아 : 저녁에 머리부분을 제외한 건조한 몸 전체에 이 약을 바르고 다음날 아침 물로 씻어낸다. 이 용법을 1회 더 반복한다.

2) 3-10세 : 머리부분을 제외한 건조한 몸전체에 이 약을 바르고 3시간 후 목욕시켜 씻어내고 다음날 이 용법을 1회 더 반복한다.

(액제)

반드시 지시한 대로만 사용하며 권장용량을 초과하지 않는다.

1. 건조 모발에 충분량을 바른다.

2. 모발 사이에 잘 문질러 바르고 4분간 방치한다. 4분 동안 머리에 샤워캡 등을 쓰지 않는다.

3. 소량의 물로 거품을 충분히 낸다.

4. 완전히 헹구어 내고 수건으로 깨끗이 닦는다.

보통 1회 적용으로 치유된다. 치료 후에도 가려움이 있을 수 있으나 이것은 치료되지 않은 것이 아니며 살아있는 이가 보이지 않는다면 재치료할 필요가 없다.

(로오숀제)

반드시 지시한 대로만 사용하며 권장용량을 초과하지 않는다.

옴 : 건조한 피부에 충분량을 문질러 펴 바른다. 상처 딱지가 있을 경우에는 따뜻한 물로 씻는 것이 치료에 도움을 주나, 이 약을 사용하기 전 1시간 이내에 씻으면 안된다. 씻은 후에 피부를 건조시킨 후 이 약을 바른다. 목에서 발끝까지 건조한 피부전신에 얇게 바른 후 잘 문지르고 8-12시간 후에 물로 완전히 씻는다. 보통 1회 적용으로 치유된다. 치료 후에도 가려움이 있을 수 있으나 이것은 치료되지 않은 것이 아니며 살아있는 옴벌레가 보이지 않는다면 재치료할 필요가 없다.

(크림제)

반드시 지시한 대로만 사용하며 권장용량을 초과하지 않는다.

1. 옴

건조한 피부에 충분량을 문질러 펴 바른다. 상처 딱지가 있을 경우에는 따뜻한 물로 씻는 것이 치료에 도움을 주나, 이 약을 사용하기 전 1시간 이내에 씻으면 안된다. 씻은 후에 피부를 건조시킨 후 이 약을 바른다. 목에서 발끝까지 건조한 피부전신에 얇게 바른 후 잘 문지르고 6-12시간 후에 물로 완전히 씻는다. 보통 1회 적용으로 치유된다. 치료 후에도 가려움이 있을 수 있으나 이것은 치료되지 않은 것이 아니며 살아있는 옴벌레가 보이지 않는다면 재치료할 필요가 없다.

보통 피부 접촉지속시간은 어린이는 6시간, 성인은 12시간까지로 제한되어야 한다.

2. 이

마른 머리에 두피와 모발 전체에 충분량을 문질러 펴 바르고 3-5분 동안 약이 작용하도록 한 후 물로 헹구어 낸다.

보통 1회 적용으로 치유된다. 치료 후에도 가려움이 있을 수 있으나 이것은 치료되지 않은 것이 아니며 살아있는 이가 보이지 않는다면 재치료할 필요가 없다.