사용상의주의사항

1. 다음의 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의할 것

1) 의사의 치료를 받고 있는 사람

2) 설사, 연변의 증상이 있는 환자(증상이 약화될 수 있다.)

3) 현저하게 위장이 허약한 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁 수축작용 혹은 골반내 장기의 유출작용에 의해 유조산의 위험이 있다)

2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황 중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 유 아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약을 복용를 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 않는다.)

3. 복용중 또는 복용후는 다음 사항을 주의할 것

1) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것. 단, 8세 미만의 유 유아에게는 복용시키지 말 것

2) 1개월 정도 복용해도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 일시 복용을 중단하고 의 또는 약사와 상의 할 것

3) 이 약을 변비 치료 목적으로 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증ㅇ가하고 변비가 악화 될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비 약이 필요한 상 태라면 변비의 원인을 조사하여야 한다.

4) 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법,용량에 주의한다.

5) 자극성 완화제는 장기간 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라 면 원인을 조사하여야 한다.

6) 다른 한방제제 등을 병용하는 경우는 함유 생약의 중복에 주의한다. 대황 함유제제는 병용 투여시 특히 주의한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타난 경우

5. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피해 가능하면 보전하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

3) 오용을 피하고, 품질을 보전하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

4) 1포를 분할하여 사용할 때에는 그 잔여분은 2일 이내에 사용할 것