

사용상의주의사항

1. 다음 부위에는 사용하지 말 것.

- 1) 상처 또는 점막 부위
- 2) 방사선 치료 부위

2. 부작용

드물게 알레르기성 피부 발진이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.
- 3) 5~6일간 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 넓은 부위에 장기간 사용하지 않는다. 살리실산은 피부를 통하여 과량이 흡수될 수도 있으며 중독을 일으킬 수 있다.
- 2) 수유기중에 유방부위에는 적용하지 않는다. 모유로 이행되거나 영아의 피해는 보고되지 않았다.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.
- 2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻는다. 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 치료를 받는다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

(의관 65624-602호, 2003.03.24)