용법용량

(환제)

1-1. 보통 성인 1회 1환

1회 8~15세 2/3환, 5~7세 1/2환, 2~4세 1/3환, 1세 이하 1/4환을

1일 1~2회 씹거나 따뜻한 물에 개어서 복용한다.

1-2. 보통 성인 1회 2환

1회 8~15세 4/3환, 5~7세 1환, 2~4세 2/3환, 1세 이하 1/2환을

1일 1~2회 씹거나 따뜻한 물에 개어서 복용한다.

(액제)(현탁제)

2-1. 보통 성인 1회 1병(1회 용량)

1회 8~15세 2/3병(성인 용량의 2/3), 5~7세 1/2병(성인 용량의 1/2), 2~4세 1/3병(성인 용량의 1/3), 1세 이하 1/4병(성인 용량의 1/4)을

1일 1~2회 복용한다.

2-2. 보통 성인 1회 20 mL

1회 8~15세 13.33 mL, 5~7세 10 mL, 2~4세 6.67 mL, 1세 이하 5 mL을

1일 1~2회 복용한다.

2-3. 보통 성인 1회 50 mL

1회 8~15세 33.33 mL, 5~7세 25 mL,

2~4세 16.67 mL, 1세 이하 12.5 mL을

1일 1~2회 복용한다.