사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. : 간장애 환자, 신장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 본인 또는 양친, 형제가 통풍발작(관절통)의 기왕력환자 또는 요산치상승환자

2) 간장애, 신장애 의심이 있는 환자

3. 부작용

1) 간장 : 간장애가 나타나는 일이 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 있을 때는

투여를 중지한다.

2) 관절 : 요산치 상승, 통풍발작(관절통)이 나타날 수 있다.

3) 혈액 : 때로 호산구증다증 등의 증상이 나타날 수 있다.

4) 과민증 : 발열, 발진등의 증상이 나타날 수 있다.

5) 위장 : 식욕부진, 구역, 구토등의 증상이 나타날 수 있다.

6) 기타 : 때로 두통, 근육통, 색소침착이 나타날 수 있다.

7) 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석·평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 면역계 : DRESS증후군

4. 상호작용 : 간장애를 일으키기 쉬운 약물과 병용할 경우는 주의하여 투여한다.