사용상의주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자, 사용시에는 각별히 주의할 것(유리앰플주사제에 한함).

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

2세 이하의 영아

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 간질 환자

2) 갑상샘기능항진증 환자

3) 급성신장염 환자

4) 급성 심근경색, 중증의 심근장애 환자(심근자극작용이 나타날 수 있다)

5) 중증의 고혈압 환자

6) 위·십이지장궤양 환자

7) 빈맥성 부정맥 환자

4. 이상반응

1) 소화기계 : 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.

2) 순환기계 : 때때로 심계항진, 열감, 빈맥 등이 나타날 수 있다.

3) 과민반응 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

4) 중추신경계 : 불안, 수면장애, 두통, 근진전 등이 나타날 수 있다.

5. 상호작용

1) 이 약을 에리트로마이신, 시메티딘, 알로푸리놀, 푸로세미드, 시프로플록사신, 에녹사신, 경구용 피임약 등과 병용투여시 이 약 중의 프록시필린의 혈중농도가 상승할 수 있다.

2) 바르비탈계 약물, 리팜피신, 이소니아지드, 페니토인, 설핀피라존, 카르바마제핀 등과 병용투여시 이 약 중의 프록시필린의 혈중농도가 감소할 수 있다.

3) 에페드린과 병용투여시 교감신경흥분작용이 증가될 수 있으므로 주의한다.

4) 리튬과 병용투여시 리튬의 작용을 저하시킬 수 있다.

6. 적용상의 주의

정맥주사시 쇼크를 일으킬 수 있으므로 천천히 주사한다.