사용상의주의사항

1. 다음 부위에는 투여하지 말 것.

1) 눈 또는 눈주위, 점막(예를 들면 구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음부, 외음부 등

2) 습진

3) 습윤(습기 참), 미란(짓무름), 균열(갈라짐) 또는 외상(상처)이 심한 환부(질환부위)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등)을 일으킨 적이 있는 환자

2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자

3) 환부(질환부위)가 안면(얼굴)이거나 광범위한 환자

4) 환부(질환부위)가 화농(곪음)성인 환자

5) 「습진」과 「무좀 · 완선(사타구니백선(증)), 체부백선」의 구분이 불확실한 환자(음부가려움, 미란(짓무름) 등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다)

6) 영아(갓난아기) · 유아

7) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 이상반응

이 약의 사용으로 인해 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옻 등에 의한 피부염, 부종(부기), 자극감, 낙설, 미란(짓무름), 건조 · 당기는 느낌, 수포 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용한다.

3) 2주 정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4) 와파린으로 치료를 받고 있는 환자의 경우에는 출혈 또는 멍이 발생할 수 있으므로 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 적용상의 주의

1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않는다.

2) 눈에 들어가지 않도록 주의한다. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻고 안과의사의 진찰을 받는다.

3) 환부(질환부위) 또는 그 주위가 더러운 경우에는 바로 사용하지 않는다.

4) 이 약이 묻은 손으로 눈이나 점막 등을 만지지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

4) 화기에 가까이 하지 않는다.