사용상의주의사항

1. 다음의 부위에는 사용하지 말 것.

1) 수두, 무좀, 백선 등 또는 화농성 환부.

2) 눈이나 눈주위, 외음부, 음낭, 점막 등

2. 다음의 환자는 사용전에 의사또는 약사와 상담할 것

1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기증상(예: 발진 · 발적, 가려움, 옻 등)을 일으킨 적이 있는 환자

2) 환부가 광범위 한 환자

3) 습진, 진무름이 심한 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 사용할 때 다음의 사항을 주의할 것.

1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것

2) 소아에 사용할 경우 보호자의 지도감독 하에 사용할 것.

3) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만약 눈에 들어간 경우 바로 물 또는 미지근한 물로 닦아 흘려 줄 것. 증상이 심한 경우에는 안과의사의 진료를 받을 것.

4) 이 약은 외용에만 사용하고 내복하지 말 것

4. 사용중 또는 사용후에는 다음 사항을 주의할 것

1) 이 약의 사용에 의한 발진 · 발적, 가려움 등의 증상이 나타난 경우에는 사용을 중 지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.

2) 이 약의 사용으로 환부에 무좀 · 진무름 등의 백선증, 여드름, 화농증상 또는 지속 적인 자극감, 발진 등의 증상이 나타난 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약 사와 상담할 것.

3) 수일간 사용해도 증상의 개선이 없을 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사 와 상담할 것.

4) 장기 연속사용을 하지 말 것.

5) 전신 및 국소 코르티코스테로이드 사용으로 시력장애가 보고될 수 있다. 환자에게 시야흐림 또는 기타 시력장애와 같은 증상이 나타날 경우, 환자를 안과의사에게 보내어 백내장, 녹내장 또는 전신 및 국소 코르티코스테로이드 사용 후 보고된 중심장액맥락망막병(CSCR)과 같은 희귀질환을 포함하여 발생 가능한 원인 평가를 고려해야 한다.

5. 보관 및 취급상의 주의

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 가능한 한 습기가 적은 서늘한 곳에 캡을 잘 닫아 보관할 것.

3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

4) 사용기한이 지난 것은 사용하지 말 것.