사용상의주의사항

1. 다음과 같은 경우(사람)에는 사용하지 말 것.

1) 다음 부위에는 사용하지 말 것.

(1) 눈 또는 눈주위, 점막(예를 들면 입안, 코안, 질 등), 음부, 외음부 등

(2) 습진

(3) 습기참, 짓무름, 갈라짐 또는 상처가 심한 질환부위

2) 만 2세 이하의 젖먹이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등)을 일으킨 적이 있는 사람

2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

3) 질환부위가 얼굴에 있거나 광범위한 사람

4) 질환부위가 곪은 사람

5) 습진과 무좀·완선(사타구니백선), 체부백선의 구분이 불확실한 사람(음부가려움, 짓무름 등의 증상이 있는 경우에는 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다).

6) 유아

7) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 사용으로 인해 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 옻 등에 의한 피부염, 부종(부기), 자극감, 발열, 통증, 짓무름 등의 증상이 나타나는 경우

2) 2주정도 투여 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용할 것.

3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.

4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻고 안과전문의의 진찰을 받을 것.

5) 질환부위와 그 주위를 깨끗이 한 후 사용할 것.

6) 사용 전에 충분히 흔들어 줄 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.