사용상의주의사항

1. 다음 환자(부위 또는 경우)에는 투여하지 말 것.

   1) 안점막등의 점막

   2) 이 약 성분에 과민증 환자

   3) 급성 습진 또는 염증성 피부질환 환자

   4) 신부전 환자에 광범위하게 적용하는 경우

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

   1) 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)

   2) 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)

   3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

   1) 자극증상 : 통증, 열감 때때로 홍조, 가려움 등의 자극증상이 일시적으로 나타나거나 투여초기에 나타날 수 있다.

   2) 과민증 : 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

   3) 피부 : 때때로 습진화, 피부의 균열(갈라짐), 구진, 따끔따끔한 느낌, 작열감, 인설, 드물게 부종, 건조화가 나타날 수 있으며 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

4. 상호작용

   이 약에 의해 코르티코이드, 디트라놀, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있다.

5. 적용상의 주의

   1) 이 약은 외용으로만 적용한다.

   2) 궤양, 미란(짓무름), 상처 부위에는 직접 적용하지 않는다.

3) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다

6. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.