사용상의주의사항

1. 경고

1) 임신부 비타민 A(레티놀)를 1일 권장량(8,000단위) 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 수 있다.

2) 철 함유제제는 6세이하의 어린이가 사고로 과량복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음 사항은 복용전에 의사 또는 약사와 상담할 것.

1) 1세 미만의 유아.

2) 의사의 치료를 받곡 있는 사람.

3) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인.

3. 복용시 다음 사항에 주의할 것.

1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것.

3) 본 제제에 하마유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 비타민 A로서 1일 8,000단위를 넘지 않도록 할 것.

4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.

1) 본 제제의 복용에 의해 구역, 구토, 설사, 가려움증의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 도는 약사와 상담할 것.

2) 본제의 복용에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 등의 증상이 있을 경우에는 중복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.

3) 본제의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질수도 있다.

4) 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담할 것.

5. 복용 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는곳에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관할 것.

3) 오용을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

2001.7.31 추가사항

철 함유제제(경구)

○ 경고

어린이에게 해를 일으키고 사망의 원인이 될 수 있는 철이 포함되어 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 한다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.