사용상의주의사항

1. 경고

의사의 지시없이 신질환 또는 나트륨제한 식이요법을 하고 있는 경우에는 이 약을 투여하지 말 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

1) 3세 미만의 소아

2) 선천성 거대결장증 또는 울혈성 심부전이 있는 환자(고나트륨혈증성 탈수증이 일어날 수 있다)

3) 심한 신장기능장애 환자(신부전이 있는 환자 포함)

4) 위장관 폐쇄, 장폐색, 천공, 항문폐쇄증 환자

5) 이 약 또는 이 약의 구성성분 대한 과민반응이 있는 사람

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 신장기능장애 환자(저칼슘혈증, 고인산혈증, 고나트륨혈증, 산성증이 나타날 수 있다)

2) 배변 습관의 갑작스런 변화가 2주이상 지속된 사람

3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

4) 3 ~ 12세 어린이, 고령자 또는 약물복용(사용)으로 의사의 관리를 받고 있는 사람

5) 거대결장증이 있는 어린이(인산일수소나트륨과 인산이수소나트륨을 함유하므로 혈청중 나트륨 농도의 급속한 상승으로 인한 탈수증이 일어날 위험이 있다)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 구역, 구토 또는 하부복통이 나타날 경우

2) 항문 불쾌감, 직장통이 나타날 경우

3) 직장의 출혈 또는 배변의 실패가 나타날 경우(심각한 질병을 암시할 수 있다)

4) 이 약을 복용(사용)후, 체류 시간이 10 분을 초과하거나 관장 용액의 반환이 없을 경우(전해질 장애와 그에 따른 심각한 부작용이 발생할 수 있다)

5) 이 약의 과량투여로 저칼슘혈증, 고인산혈증, 고나트륨혈증, 고나트륨혈증성 탈수증, 산성증이 유발될 수 있다.

(1) 저칼슘혈증, 고인산혈증, 고나트륨혈증 및 산성증 : 칼슘, 인산염, 염화물, 나트륨의 농도를 주의 깊게 관찰해야 한다. 전해질평형을 되찾기 위해서는 적절한 액체를 보충해 줌으로써 즉각적으로 중화시켜야 한다.

(2) 고나트륨혈증성 탈수증 : 칼슘, 인산염, 염화물, 나트륨의 농도를 주의 깊게 모니터링하여야 한다. 탈수증의 심한 정도와 임상반응에 따라 처음 12 ~ 24시간 동안 체표면적당 3,000 ~ 4,000 mL/m^2의 속도로 세포외액(40 ~ 50 mEq/L)보다 낮은 농도의 나트륨과 염화물을 함유하는 액체와 적당한 농도의 칼륨(20 ~ 30 mEq/L)을 함유하는 액체를 신속하게 비경구 투여하여야 한다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 의사의 지시 없이 1주일 이상 사용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.