사용상의주의사항

1.다음 사람은 사용전에 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것.

1)약물로 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적,가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 환자

2)의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자

2.사용할 때에는 다음 사항에 주의할 것

1)정해진용법, 용량을 지킬 것.

2)소아에 사용하는 경우 보호자의 지도, 감독하에 사용할 것.

3)구강용으로만 사용하고 안과용 등 타용도로 사용하지 말 것.

3.사용중 또는 사용후에는 다음 사항에 주의할 것.

1)본제 사용으로 증상이 악화되거나 또는 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적 가려움증 등)을 일으키는 경우 사용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의 할 것.

2)수일간 사용하여도 증상이 개선되지 않는 경우, 사용을 중지하고 의사, 치과의사 또는 약사와 상의할 것.

4.보관 및 취급상의 주의사항

1)소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2)직사일광을 피하고 가능한 습기가 적고 서늘한 장소에(밀전하여) 보관할 것.

3)오용을 막고 품질을 보호, 유지하기위해 타용기에 넣지 말 것.