용법용량

1. 투여용량

아나필락시양 반응의 가능성 때문에, 악성림프종 환자는 최초 투여량을 2unit 이하로 투여한다. 급성 아나필락시양 반응이 발생하지 않으면, 정상적인 투여스케줄에 따른다 정상적인 투여스케줄은 다음과 같다.

1) 편평상피암종, 비 Hodgkin's 병, 고환암종 : 0.25-0.50 units/kg(10-20units/㎡)을 1주일에 1-2회 정맥주사·근육주사·피하주사한다.

2) Hodgkin's 병 : 0.25-0.50 units/kg(10-20units/㎡)을 1주일에 1-2회 정맥주사·근육주사·피하 주사한다. 50% 반응후, 유지용량은 매일 1unit 혹은 1주일에 5units를 정맥 및 근육주사한다. 총 투여량이 400units를 초과하면, 체독성이 현격히 증가하므로, 신중히 투여해야 한다.

3) 악성 흉막삼출 : 60units을 흉막내 투여한다.

2. 투여방법

1) 정맥주사

본제 15-30units을 생리식염액 등의 적당한 정맥용 주사액 5-10ml에 용해하여 10분이상 서서히 정주한다.

2) 근육 내 주사, 피하주사

생리식염액 등의 적당한 용해액 1-5ml에 본제 15units, 2-10ml에 본제 30units을 용해하여 근육내 주사 또는 피하주사한다.

3) 흉막 내 주사

본제 60units을 생리식염액 등의 적당한 용해액 50-100ml에 용해하여 투여한다.