사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

의사의 치료를 받고 있는 환자

2. 일반적주의

1) 정해진 용법. 용량을 잘 지킨다.

2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

3. 상호작용

테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 방해할 수 있으므로 병용투여하지 않는다.

4. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아에게 투여할 경우에는 약사 또는 의사와 상의한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다,

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

□ "유당(무수유당 및 유당수화물 등)" 함유제제

○ 사용상의 주의사항

○ 다음 환자에는 투여하지 말 것. (경구제 및 주사제에 한함.)

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.