사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 사용하지 말 것

이 약의 성분에 대한 과민증이 있는 환자

2. 이상반응

1) 주성분의 보존제로 사용된 페놀로 인한 알레르기반응을 일으킬 수 있다.

2) 국내 시판후 조사결과 이 약을

투여하는 동안 가벼운 정도의 소양감(가려움), 통증, 출혈이 보고되었으나, 이 증상이 치질의 진행과정에서 나타난 것인지, 이 약과의 인과관계가 있는 것인지는 확실하지 않다.

3. 일반적 주의

1) 재발을 방지하기 위하여 염증 및 가려움, 수포, 작열감(화끈감) 등의 증상이 소실되더라도 장기간 계속하여 바른다.

2) 수일간 사용하여도 증상의 개선이 나타나지 않거나 이 약 사용에 의해 통증, 소양감(가려움), 출혈 등이 지속되는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 상호작용

타 약물과의 상호작용은 지금까지 알려진바 없다.

5. 적용상의 주의

1) 이 약이 무르게된 경우에는 잠시 냉각시킨 후에 사용하며 또한 지나치게 경화된 경우에는 무르게 한 후 사용한다. (좌제에 한함)

2) 이 약은 직장(곧창자)에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 않는다. (좌제에 한함)

3) 이 약은 항문부위에만 사용하고 안과용으로는 사용하지 않는다. (연고제에 한함)

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 좌제는 체온으로 녹기 쉽도록 제조되어 있기 때문에 직사일광이나 온도가 높은 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관한다. (좌제에 한함)

3) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 서늘한 곳에 보관한다. (연고제에 한함)

4) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.