사용상의주의사항

(1)다음 환자에는 투여하지 말 것.

임신 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

(2)다음 환자에게는 신중히 투여할 것.

1)본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자.

2)약으로 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자.

3)간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자

4)심장애 및 고혈압 환자, 고령자

5)녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등)환자, 배뇨장애 환자

6)의사의 치료를 받고 있는 환자

(3)부작용

1)이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 구역, 구토, 식용부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

2)이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

(4)일반적 주의

1)정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.

2)수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

(5)상호작용

다른 진해거담제, 감기약, 황히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용투여하지 않는다.

(6)소아에 대한 투여

7세 이하의 영 유아에는 시럽제를 투여한다.

(7)저장상의 주의사항

1)소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관한다.

2)직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3)오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.