사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1)염증성 열이 있는 자

2)이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

임산부

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것

⑴ 혈압이 높은 환자 또는 고령자

⑵ 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자

⑶ 부종이 있는 환자

⑷ 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

⑴ 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈 꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증 상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것

⑵ 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감초로서 1g이상인 제제는 장기 연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중 증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것

⑶ 근병증: 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루 프계이뇨제(푸루세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨계(트리클로 르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것

6. 부작용

: 글리시리진산으로서 1일 최대량 40밀리그람 이상을 함유하는 제제는 장 기 연용시 저칼륨혈증, 나트륨체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 알도스 테론 유사증상이 나타날 수 있으므로 주의하여 사용할 것.

7. 저장상의 주의사항

⑴ 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.(사용 후 반드 시 밀폐보관 할 것.)

⑵ 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.