용법용량

이 약은 다음과 같은 연속적인 3단계 용법으로 투여한다.

단계	용법	주사/주입 속도	아토시반 용량
1	0.9ml 정맥주사(bolus)	1분 이상	6.75 mg
2	3시간 동안 부하 정맥점적주입	24 ml/hr	18 mg/hr
3	연속적인 정맥점적주입	8 ml/hr	6 mg/hr

처치시간은 48시간을 넘지 않도록 하고, 처치 기간 동안 총 용량은 330mg이 넘지 않도록 한다. 조산의 진단이 내려진 후 가능한 빨리 이 약의 투여를 시작하여야 한다. 급속정맥주사 종료 후 바로 점적 주입을 시작하고, 이 약의 투여 후에도 자궁수축이 지속되면 다른 치료법을 고려해야 한다. 이 약의 재투여가 필요한 경우, 위의 3단계 투여를 다시 순서대로 시행한다.

○ 정맥 점적 주입액 조제

점적주입용 약(5ml)은 0.9%(w/v) 염화나트륨 주사액, 젖산 링겔액, 5%(w/v) 포도당 주사액에 희석하여 사용할 수 있다. 희석액 100ml에서 10ml를 빼내 버리고, 점적주입용 바이알(5ml) 2개로부터 이 약을 취해 넣어 0.75mg/ml 농도로 조제한 것을 24ml/hr(즉, 18mg/hr)의 속도로 3시간 동안 주입하고, 그 이후에는 주입속도를 8ml/hr(즉, 6mg/hr)로 낮추어 준다. 다른 용량의 희석액 용기를 사용하려면 용량에 따라 상기와 같은 농도가 되도록 계산하여 조제한다.