용법용량

(캡슐제)

○ 성인 : 린코마이신으로서 중증감염에 1회 500mg(역가)을 8시간마다 경구투여하며, 심한 중증감염에는 1회 500mg(역가)을 6시간마다 투여한다.

○ 소아(1개월 이상) : 중증감염에 1일 체중 Kg당 30mg(역가)을 3~4회 분할 투여하며, 심한 중증감염에는 체중 Kg당 60mg(역가)을 3~4회 분할 투여한다.

베타-용혈성연쇄구균 감염증에는 치료 후에 속발될지도 모르는 류마티스성 열이나 사구체신염을 예방하기 위하여 최소한 10일 이상 계속 투여하는 것이 바람직하다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

(주사제)

1. 근육주사

○ 성인 : 린코마이신으로서 중증감염에 1회 300mg(역가)을 1일 2회 근육주사하며 심한 중증감염에는 1회 600mg(역가)을 1일 2회 근육주사한다.

○ 소아(1개월 이상) : 중증감염에 1일 체중 Kg당 10mg(역가)을 1~2회 분할하여 근육주사한다.

2. 정맥주사

○ 성인 : 중증감염에 1일 600~1000mg(역가)을 2~3회 분할 점적 정맥주사하며 심한 중증감염에는 증량하여 주사할 수 있다.

○ 소아(1개월 이상) : 중증감염에 1일 체중 Kg당 10~20 mg(역가)을 2~3회 분할 점적 정맥주사한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

3. 투여방법

이 약은 정맥 내에 투여하기 전에 반드시 희석되어야 한다. 희석용액으로는 생리식염주사액이나 5% 포도당 주사액이 사용된다.

희석 비율 및 주입속도는 아래와 같다.

용량(mg)	희석용량(mL)	주입시간(hr)
600	100	1
1000	100	1
2000	200	2
3000	300	3
4000	400	4