사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체부위)에는 이 약을 사용하지 말 것

   1) 30개월 이하의 유아

   2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자

   3) 눈주위, 눈점막 등

   4) 피부손상(상처, 습진), 발적부위, 데인곳

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것

   다른 외용진통제와 같이 사용하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

   1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움증, 옻 등에 의한 피부 염 등)이 나타난 적이 있는 환자

   2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자

   3) 의사의 치료를 받고 있는 환자

   4) 습윤이나 진무름이 심한 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

   1) 이 약의 사용으로 인해 발진, 발적(종창), 가려움, 색소침착, 피부박리 등의 증상이 나타나는 경우

   2) 5~6일간 사용하여도 증상이 개선되지 않을 경우

   3) 상태가 악화되었을 경우

   4) 몇일 내 증상이 다시 재발하였을 경우

5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

   1) 이약은 외용으로만 사용한다.

2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용한다.

3) 열패드와 같이 사용하지 않는다.

4) 깨끗하고 건조한 피부에 붙인다.

5) 피부가 약한 사람은 같은 부위에 계속 붙이지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

〈 특정성분 주의사항 〉

캄파 (주성분 및 첨가제 모두 포함)

● 효능 및 효과 (소아에 대한 효능·효과가 있는 경우에 한함)

소아에 대한 효능·효과 삭제

● 사용상의 주의사항

○ 다음 환자에는 투여하지 말 것.

30개월 이하의 유아

○ 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

소아 (경련을 유발할 수 있다.)