용법용량

○ 보통 성인 레보플록사신으로서 1일 1회 250~750 mg을 경구투여한다.

1. 정상 신장기능(크레아티닌 청소율이 분당 80 mL 초과)인 환자

적응증	단위용량 및 투여간격	투여기간
복잡성 피부 및 연조직 감염	750mg 24시간	10~14일
지역사회감염 폐렴	500mg 24시간	7일
만성기관지염의 급성 세균성 악화		7일
급성 부비동염		10~14일
만성 세균성 전립선염		28일
경·중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합요로감염	250mg 24시간	10일
경·중등도의 단순요로감염		3일

2. 신장애 환자

1) 복잡성 피부 및 연조직 감염

크레아티닌 청소율(mL/min)	초회용량	유지용량
50~80	용량조절 할 필요 없음	
20~49	750mg	48시간마다 750mg
10~19	750mg	48시간마다 500mg
혈액·복막투석 환자	750mg	48시간마다 500mg

2) 지역사회감염 폐렴, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화, 급성 부비동염, 만성 세균성 전립선염

크레아티닌 청소율(mL/min)	초회용량	유지용량
50~80	500mg	24시간마다 250mg
20~49	500mg	24시간마다 250mg
10~19	500mg	48시간마다 250mg
혈액·복막투석 환자	500mg	48시간마다 250mg

3) 경 · 중등도의 급성 신우신염을 포함한 복합요로감염

크레아티닌 청소율(mL/min)	초회용량	유지용량
〉20	용량조절 할 필요 없음	
10~19	250mg	48시간마다 250mg

4) 경 · 중등도의 단순요로감염 : 용량조절 할 필요 없음