용법용량

아침식사 또는 다른 식사시에 약간의 물과 함께 복용한다.

○ 성인

1. 경증내지 중등도 본태고혈압

토르세미드로서 초기용량 및 평균유지용량은 1일 1회 2.5 mg을 경구투여한다. 이 용량으로 적절한 혈압강하효과가 얻어지지 않으면 1일 용량을 5 mg으로 증량시킬 수 있다.

그 이상의 용량으로 증가시켜도 일반적으로 효과가 증가되지 않는다.

2. 울혈심부전에 기인한 부종

초기용량 및 평균유지용량으로 1일 1회 5 mg을 경구투여한다. 치료효과가 적절하지 않으면 임상 증상에 따라 1일 1회 20 mg까지 투여할 수 있다.

3. 간경변(복수)에 기인한 부종

초기용량으로 1일 1회 5 mg을 경구투여한다. 임상증상에 따라 1일 용량을 40 mg까지 증량할 수 있다.

4. 신질환에 기인한 부종

초기용량으로 1일 5 ~ 20 mg을 경구투여한다. 임상증상에 따라 1일 100 mg까지 투여할 수 있다.

○ 간부전 환자

중증 간부전 환자에는 이 약을 투여하지 않는다.

○ 고령자

고령자에게 특별한 용량조절은 필요하지 않다.