사용상의주의사항

1. 경고

협각녹내장이 있을 시에는 사용전에 의사와 상의한다

2. 이상반응

1) 눈동자가 일시적으로 커질 수 있다

2) 남용시 눈충혈이 더 심해질 수 있다.

3. 일반적주의

1) 눈의 통증이 느껴질 경우에는 사용을 중지하고 의사와 약사와 상담한다.

2) 시력 변화가 느껴질 경우에는 사용을 중지하고 의사와 약사와 상담한다.

3) 눈의 충혈이나 자극감이 지속될 경우에는 사용을 중지하고 의사와 약사와 상담한다.

4) 증상이 악화되거나 72시간이상 지속 될 경우에는 사용을 중지하고 의사와 약사와 상담한다.

5) 사용전에 콘택트렌즈를 제거한다.

4. 적용상의 주의

1) 오염을 방지하기 위해 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의할 것.

2) 매 사용 후 뚜껑을 닫을 것

3) 용액의 색이 변하거나 뿌옇게 흐려진 경우 사용하지 않는다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

사용 전에 의사와 상담할 것.

6. 저장상 주의 사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 마셨을 경우, 응급처치를 하거나 즉시 전문가의 도움을 받을 것.