사용상의주의사항

1. 경고

앰플 주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 이 약에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자

2) 임부 또는 임신하고 있는 가능성이 있는 여성

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제, 항혈소판제)을 복용하고 있는 환자

2) 수술이 예정된 자

4. 이상반응

1) 드물게 가벼운 위장장애, 특히 알러지가 있는 환자에게는 순환기장애 증상(저혈압, 현기증, 두통, 열감, 개인에 따라 심박동장애), 불면, 알러지성 피부증상이 일어날 수 있다.

2) 개인에 따라 부분적으로 다소 빈번하게, 말단부위의 통증, 위장장애, 발열, 오한, 쇽 등이 관찰된다.

3) 피로, 만성기도폐색, 하지부종, 협심증 유사증상이 나타날 수 있다.

4) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다.

5. 수유부

모유 수유 중에는 복용을 피하는 것이 좋다. 은행엽엑스 성분이 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않다.

6. 기타

이 약은 당 대사에 영향을 주지 않는다는 보고가 있다.