

용법용량

(겔제)

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5 ~ 1 g을 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안, 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2 g을 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

(액제) 2 %, 5 %

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5 ~ 1 mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안, 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2 mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.

(액제) 3 %

○ 남성

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5 ~ 1 mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안, 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 2 mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단후에는 탈모가 재발될 수 있다.

○ 여성

- 1) 모발과 두피를 완전히 건조시킨 후, 이 약 0.5 mL를 1일 2회(아침, 저녁), 최소 4개월 동안, 환부에만 바른다.
- 2) 1일 총 투여량이 1.3 mL를 초과하지 않는다.
- 3) 이 약의 사용 중단 후에는 탈모가 재발될 수 있다.