사용상의주의사항

1. 복용시에, 다음의 사항에 주의 할 것

1) 정해진 용법, 용량을 지킬 것

2) 자극성 완화제는 계속 복용 시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.

2. 사용 중 또는 사용 후는 다음의 사항에 주의할 것

본 제의 복용에 의해, 발진/발적/가려움, 심한복통, 설사, 구토 등이 나타난 경우에는 복용을 중지하고, 의사나 약사에게 상담할 것

3. 보관 또는 취급상의 주의

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하고, 습기가 적은 장소에 보관할 것.

3) 본품은 천연제품이므로, 흡습하여 곰팡이, 충해 등이 발생할 우려가 있다. 보관에는 충분한 주의를 할 것.

4) 오용을 피하고, 품질을 유지하기 위해, 다른 용기에 바꿔 넣지 말 것.

5) 본품에는 품질유지(곰팡이, 충해방지)를 위해 탈산소제를 넣었다. 개봉 후 고온다습을 피하고, 가능한 한 빨리 사용할 것.

6) 탈산소제는 먹지 않을 것.