# 사용상의주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

1) 페노치아진계 약물 및 그 유사화합물에 과민증 환자

2) 녹내장환자(항콜린작용에 의합니다.)

3) 전립선비대 등 하부요로 폐색성 질환 환자(항콜린작용에 의합니다.)

4) 혼수상태 환자 또는 바르비탈계 약물, 마취제 등 중추신경억제제를 대량 투여 중인 환자

5) MAO 억제제를 투여 중인 환자

6) 간질 환자

7) 간염 환자

8) 소아

9) 이 약에 알레르기 증상의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.

1) 신장애 환자

2) 간장애 환자

3) 협착성 소화성 궤양 또는 유문 · 십이지장 폐색 환자

4) 급성 알코올 중독 환자

5) 유문 · 십이지장 궤양 환자

6) 조혈장애 환자

7) 천식, 기관지염, 기관지확장증 등 하기도 질환 환자

8) 수면무호흡증의 병력 환자

9) 고령자

3. 이상반응

1) 과민증 : 드물게 발진, 광선과민증, 피부반응(독성, 알레르기성) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하십시오. 복용 후 곧바로 두드러기, 부종, 가슴쓰림 등과 동시에 안색창백, 수족냉감, 식은 땀, 숨가쁨 등 쇽(아나필락시)이 나타날 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사의 진료를 받으십시오.

2) 간 : 드물게 전신피로, 황달, ALT 상승, AST 상승, 담즙울체가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

3) 혈액 : 드물게 조혈장애로 혈소판 감소가 나타나 코출혈, 잇몸출혈, 청색 반점 등의 출혈증상이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하십시오.

4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 권태감, 어지러움, 드물게 두통, 정신착란, 흥분, 불안이 나타날 수 있습니다.

5) 소화기계 : 때때로 구갈, 위부불쾌감, 드물게 설사, 위통, 식욕부진, 구역, 구토, 변비, 복통 등이 나타날 수 있습니다.

6) 순환기계 : 드물게 흉부고민감, 심계항진, 저혈압이 나타날 수 있습니다.

7) 비뇨기계 : 드물게 배뇨곤란 등이 나타날 수 있습니다.

8) 기타 : 드물게 인후통, 부종, 안면홍조, 시력장애, 월경이상, 미각이상, 구내마비감이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

졸음이 올 수 있으므로 이 약을 투여 중인 환자는 자동차 운전 등 위험한 기계 조작에 종사하지 않도록 주의하십시오.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부 : 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 마십시오.

2) 수유부 : 동물실험에서 이 약이 모유 중에 이행되었다는 보고가 있으므로 투여 중에는 수유를 중지하십시오.

6. 소아에 대한 투여

1) 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)

2) 다른 페노치아진계 약물을 소아(특히 2세 이하)에 투여한 경우 유아돌연사망증후군(SIDS) 및 유아 수면 시 무호흡발작이 나타났다는 보고가 있습니다.

7. 상호작용

바르비탈계 약물, 마취제, 마약성 진통제 또는 신경안정제 등의 중추신경억제제, 항우울약, 혈압강하제 또는 아트로핀양 작용을 나타내는 약물과 병용 또는 알코올 섭취에 의해 상호작용이 증강될 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.

8. 과량 투여시의 처치

과량 투여시의 증상은 무기력, 구역, 구토가 나타나며 이러한 증상이 나타날 경우에는 인공호흡, 항경련성 치료, 위세척 또는 지지요법을 하십시오.