용법용량

1. 혈관 수술 및 혈액체외순환에 수반한 혈전, 색전의 치료 및 혈류장애의 개선 :

염산티클로피딘으로서 통상 성인 1일 200 ~ 300mg을 2 ~ 3회 나누어 식후 경구 투여 한다.

2. 만성 동맥폐쇄증에 수반한 궤양, 동통 및 냉감 등의 저혈성 제증상의 개선 :

염산티클로피딘으로서 통상 성인 1일 300 ~ 600mg을 2 ~ 3회 나누어 식후 경구 투 여한다.

3. 허혈성 뇌혈관 장해에 수반되는 혈전, 색전의 치료 :

염산 티클로피딘으로서 통상 성인1일 500mg을 2회에 나누어 식후 경구 투여한다.

4, 뇌지망막하 출혈 수술후의 뇌혈관 연축에 수반된 혈류장해의 개선 :

염산 티클로피딘으로서 통상 성인 1일 300mg을 3회에 나누어 식후 경구 투여한다.

5. 관상동맥질환(협심증, 심근경색)에 수반되는 혈전.색전의 예방, 치료 및 저혈성 제증상의 치료 :

염산 티클로피딘으로서 통상 성인 1일 500mg을 2회 나누어 식후 경구 투여한 다. 단, 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

6. 관상동맥내 스텐트 삽입시술후 아급성 혈전의 예방 :

스텐트 삽입전날 또는 삽입일로부터 투여를 시작하며 식후 1일 500mg을 2회에 나누어 아스피린과 병용하여 4 ~ 6주간 투여한다.