# 용법용량

1. 본태성 고혈압

(1) 성인

네비보롤로서 1일 1회 5mg을 매일 같은 시간에 경구투여한다.

보통 치료 1~2주후부터 혈압강하효과가 나타나며, 경우에 따라 4주후에 효과가 나타날 수 있다.

음식과 함께 복용할 수 있다.

(2) 신부전 환자

초회량은 네비보롤로서 1일 1회 2.5mg을 경구투여한다.

필요시 1일 용량은 5mg으로 증량할 수 있다.

(3) 고령자

65세 이상 고령자에서의 초회량은 네비보롤로서 1일 1회 2.5mg이다.

필요시 1일 용량을 5mg으로 증량할 수 있다.

75세 이상에서는 임상경험이 충분하지 않으므로 신중히 관찰하여 투여한다.

2. 만성 심부전

(1) 70세 이상의 노인 환자

이 약은 지난 6주간 급성 심부전의 병력이 없었던 만성 안정형 심부전환자에 투여되어야 하며, 이 약 투여 2주전까지 이뇨제, 디곡신, ACE 저해제, 안지오텐신 II 수용체 차단제등의 심혈관계 약물들의 투여량이 안정화되어야 한다.

이 약은 환자의 상태를 고려하면서 환자별 최적의 용량에 도달할 때 까지 1~2주 간격으로 점차적으로 용량을 증량하여야 한다.

네비보롤로서 1일 1회 1.25mg으로 치료를 시작하며, 필요한 경우 1일 1회 2.5 mg, 1일 1회 5 mg, 1일 1회 10 mg 까지 증량할 수 있다. 1일 최대 복용량은 10 mg 이다.

음식과 함께 복용할 수 있다.

(2) 신부전환자

최대 내성용량까지의 증량은 개개 환자별로 조절되므로 경증에서 중등도의 신부전환자에서의 용량 조절은 필요하지 않다. 중증의 신부전 (혈청 크레아티닌 ≥ 250 μmol/L) 환자에서의 사용경험이 없으므로 투여하지 않는다.