용법용량

이 약은 다른 약물이 부적절하거나 비효과적일 경우 단독 또는 치아짓계 이뇨제 및 다른 혈압강하제와 병용요법으로 투여할 수 있다. 음식물은 이 약의 생체내이용율에 거의 또는 전혀 영향을 미치지 않으므로 식사와 관계없이 투여할 수 있다. 용량은 환자의 혈압반응에 따라 조절한다.

○ 성인

1. 초회량

염산테라조신으로서 초회량으로 취침전 1㎎을 경구투여하며, 이 용량을 초과해서는 안된다. 초회투여로 인한 급성 저혈압 발현 가능성을 최소화하기 위하여 초회 투여의 복약상태를 신중히 관찰한다.

2. 유지량

1) 고혈압

① 단독투여 : 유지량으로 1일 1회 2-10㎎을 투여하며 아침 또는 저녁에 복용하되 계속해서 같은 시간에 투여하는 것이 바람직하다. 바람직한 혈압반응을 얻기 위해 1주간격으로 용량을 2배로 증량할 수 있다. 20㎎ 이상의 용량을 투여해도 더 큰 효과를 나타내지는 않으며 40㎎ 이상의 용량 투여에 관한 연구는 실시된 바 없다.

② 치아짓계 이뇨제 및 다른 혈압강하제와 병용투여 : 치아짓계 이뇨제 또는 다른 혈압강하제와 병용투여하는 경우에는 이 약의 용량을 감량하며 필요한 경우 증량한다. 이러한 병용투여 요법시 저혈압이 나타날 수 있으므로 신중히 관찰한다.

2) 양성전립선비대에 의한 배뇨장애

이 약으로서 증상이 개선될 때까지 천천히 증량한다. 유지량으로 1일 1회 5-10㎎을 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.