사용상의주의사항

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000I.U 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000I.U/일 이상 투여하지 말 것.(비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말것.

1) 복용후 다음과 같은 증상이 나타날 경우

: 피부(가려움), 소화기(오심(구역), 구토)

2) 1개월정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우.

3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4.. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.

2) 임신 3개월이내 또는 임신을 원하는 여성.

(임신전 3개월부터 임신 3개월사이에 비타민 A를 1일 10,000I.U 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천이상의 비율이 증가한다는 보고가 있다.)

5. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 설사

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시킬 것.

3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

1) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것