사용상의주의사항

1. 다음 사람은 복용하지 말 것.

1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상[예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀,입 술 등)]을 일으킨 적이 없는 사람

2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사 람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의 할 것.

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두 통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

2) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유·유아 및 어린이(14세이하)

3) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람

4) 고령자

5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

7) 천식, 녹내장, 전립선비대 환자

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

1) 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것. 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등

3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도감독하에 복용시킬 것

5. 복용중 또는 복용후에도 다음 사항을 주의할 것

1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것

① 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답 함 등과 함 께 안색이 창백해지고, 수족이 차가와지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등쬘 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈 의 점막에 나타난 경우

③ 천식이 나타난 경우

2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트 아미노펜 을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가 시킬 수 있다. 알 코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

3) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것

5) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

6) 장기 연용하지 말 것.

6. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것

2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것

3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

7. 경고

매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 약사 또는 의사와 상의해야한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유 발될 수 있다.