사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사와 상의할 것.

1) 심장병 환자

2) 고혈압 환자

3) 갑상선 질환자

4) 당뇨병 환자

5) 전립선(전립샘) 비대증(붓는 증상)으로 인한 배뇨장애 환자

2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

2) 이 약은 3일 이상 사용하지 않으며, 빈번하고 장기적인 사용은 코막힘을 재발하 거나 악화시킬 수 있으므로 지시된 대로만 사용한다.

3) 이 약을 사용 시 일시적으로 화끈거림, 따가움, 재채기, 콧물 증가 등과 같은 가 벼운 통증이 나타날 수 있다.

4) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 않는다.

5) 3일 이상 사용해도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 의사 와 상담한다.

6) 수유중이라면 사용 전에 건강 전문의에게 상담한다.

3. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 실온에서 보관한다.