사용상의주의사항

1. 경고

1) 앰플주사제는 용기 절단 시 유리파편이 혼입되어, 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용 시

유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 소아, 고령자 사용 시에

는 각별히 주의한다.

2) 벤질알코올은 조숙아에게서 치명적인 가쁜 호흡증상과 연관이 있는 것으로 보고되었다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 뇌출혈 직후의 환자(뇌혈관확장에 의해 재출혈의 가능성이 있다.)

2) 신생아, 미숙아 (벤질알코올을 함유하고 있다.)

3) 심근경색 및 그 병력이 있는 환자

3. 이상반응

1) 쇽 : 드물게 흉부불쾌감, 구역, 안면홍조, 기침, 딸꾹질, 발열 등의 증상이 나타 날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 순환기계 : 가슴이 답답함, 일과성 심계항진, 부정맥 등이 나타날 수 있다.

3) 소화기계 : 구역, 구토, 식욕부진, 위통, 변비 등이 나타날 수 있다.

4) 호흡기계: 기침발작이 나타날 수 있다.

5) 중추신경계: 두통이 나타날 수 있다.

4. 상호작용

디피리다몰은 이 약의 분해산물인 아데노신의 혈중농도를 상승시켜, 이 약의 심혈관에

대한 작용을 증강시킨다는 보고가 있으므로 병용투여 시 주의한다.

5. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

7. 고령자에 대한 투여.

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하여 투여한다.

8. 적용상의 주의

정맥 내에 신속히 주사하면 일시적인 흉부불쾌감, 구역, 두통, 안면홍조, 기침, 딸꾹질,

발열, 기관지경련 등을 일으키는 경우가 있으므로 주사의 속도는 가능한 한 느리게 한다.