# 용법용량

## (경구 : 정제, 캅셀제)

1. 강직간대발작(대발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 : 용량은 발작의 정도, 환자의 내약성에 따라 조절해야 하며, 필요한 경우 혈중농도를 측정한다. 이 약은 1일 1회 용법으로 투여해서는 안되며 반드시 분할투여한다.

1) 성인 : 페니토인 및 페니토인나트륨으로서 1회 100㎎을 1일 3회 경구투여하고 유지량으로는 페니토인 및 페니토인나트륨으로서 300-400㎎을 분할투여한다. 1일 페니토인 및 페니토인나트륨으로서 600㎎까지 증량할 수 있다.

2) 소아 : 페니토인 및 페니토인나트륨으로 체중 ㎏당 5㎎을 2-3회 분할투여하고 유지량으로는 페니토인 및 페니토인나트륨으로 1일 체중 ㎏당 4-8㎎을 분할투여한다. 1일 페니토인 및 페니토인 나트륨으로 300㎎까지 투여할 수 있다.

2. 디기탈리스중독으로 인한 부정맥

성인 : 페니토인 및 페니토인나트륨으로서 첫날 1000㎎, 둘째날 500㎎을 투여하며 유지량으로 1일 100㎎을 3-4회 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

## (주사제)

1. 간질중첩상태, 경구투여로 발작의 억제가 곤란한 경우

성인 : 페니토인나트륨으로서 150-250㎎을 분당 50㎎을 넘지 않는 속도로 천천히 정맥 주사한다. 필요하다면 30분 후에 100-150㎎을 추가로 투여한다.

2. 디기탈리스 중독으로 인한 부정맥

성인 : 페니토인나트륨으로서 부정맥이 소실될 때까지 5분마다 100㎎을 정맥주사하며 총투여량은 1g을 초과하지 않는다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.