사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 본인 또는 상대방이 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증인 경우

2) 적용 부위에 외상 또는 염증 환자

3) 상대방이 임신중인 경우

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 간·신질환 환자

2) 이 약은 프로필렌 글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오

3. 일반적 주의

1) 본인 또는 상대방에 발진 또는 자극이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 증상이 계속되는 경우에는 의사와 상담한다.

2) 의사의 감독을 받지 않고 3개월 이상 이 약을 사용하지 않는다.

4. 적용상의 주의

1) 외용으로만 사용하며 눈 또는 코에 사용하지 않는다.

2) 동일한 부위에 연속해서 3초 이상 분사하지 않는다.

5. 저장 및 취급상의 주의

1) 유·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 40℃ 이상의 고온 또는 저온의 장소, 일광이 닿는 곳에 보관하지 않는다.

3) 사용후 불 속에 버리지 않는다.