사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이약을 사용하지 말 것.

1) 출혈성 혈액 질환(혈우병, 혈소판 감소증, 자반병 등)이 있는 환자(혈액응고억제작용을 가지므로, 출혈을 일으킬 우려가 있다.)

2) 근소한 출혈에서도 중대한 결과를 초래하는 것이 예상되는 환자(혈액응고억제작용을 가지므로, 출혈을 일으킬 우려가 있다.)

3) 5세 이하의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 과민증 : 때때로(0.1~5%) 피부자극감, 가려움, 발진, 발적이 있으며, 이러한 증상이 나타났을 경우에는 사용을 중지한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 투여부위 : 궤양, 짓무름 부위에는 직접 문질러 바르는 것을 피하며, 눈 및 점막에는 사용하지 않아야 한다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.